



Aree protette  
dell'Emilia-Romagna

Area di Riequilibrio Ecologico  
dell'Emilia Romagna

# Oasi di Budrio



CITTÀ DI  
CORREGGIO



## La flora e la vegetazione dell'Oasi

Le flora dell'Oasi è rappresentata da piante terrestri, che costituiscono il bosco planiziale, e da piante tipiche dell'ambiente umido, che vivono ai margini e all'interno del lago.


Con **bosco planiziale** si fa riferimento all'ecosistema forestale che un tempo caratterizzava le aree planiziali della Pianura Padana.

Tra le **specie arboree** dominano la farnia, il carpino bianco, e l'acero campestre. La vegetazione naturale, quasi completamente scomparsa dalla pianura a causa dell'attività umana, è spesso riscontrabile solo lungo i corsi d'acqua con boschetti ripariali costituiti da pioppo bianco, farnia, frassino meridionale e olmo campestre.

Nello **strato arbustivo** si rilevano diverse specie, tra cui il nocciolo, il sambuco comune, il corniolo, la sanguinella, il biancospino, la fusaggine e il prugnolo selvatico.



La flora tipica degli **ambienti umidi** comprende piante adattate a condizioni di alta umidità, suoli saturi d'acqua o sommersi per brevi o lunghi periodi. All'interno di una zona umida possiamo riconoscere le **idrofite**, piante acquatiche sommerse o galleggianti, come la lenticchia d'acqua, le ninfee, la castagna d'acqua e le brasche, e le **elofite** come la canna di palude e la tifa, che crescono lungo le sponde.





Aree protette  
dell'Emilia-Romagna

Area di Riequilibrio Ecologico  
dell'Emilia Romagna

# Oasi di Budrio



CITTÀ DI  
CORREGGIO



## Scheda botanica

A cura di LPP-UNIMORE

**NOME:** SANGUINELLA ( *Cornus sanguinea* L. )

**FAMIGLIA:** Cornaceae


**CARATTERISTICHE:** portamento arbustivo largo, fino a 10 m; corteccia grigia, liscia e con lievi rugosità arrotondate; rametti sottili, dritti e lucidi, particolarmente rossastri in inverno.

**FOGLIE:** decidue, semplici, in coppie opposte; circa 6x3 cm; con peli ispidi sparsi su entrambe le pagine; 3 o 4 paia di venature; di colore rosso in autunno.

**FIORI:** a inizio estate; infiorescenze bianco spento, molto profumate.

**FRUTTI:** drupe nero-violacee da 7 mm, il cui olio in passato era usato per saponi e lampade ad olio.

**AMBIENTE:** vegeta dalla pianura fino a 1300 m s.l.m. tra i filari degli alberi, nei boschi misti di latifoglie, al margine dei prati, nelle macchie in riva all'acqua. Predilige terreni fertili e freschi; pioniera che compare tra le prime legnose nei terreni abbandonati e forma facilmente associazioni con altre specie autoctone.





Aree protette  
dell'Emilia-Romagna

Area di Riequilibrio Ecologico  
dell'Emilia Romagna

# Oasi di Budrio



CITTÀ DI  
CORREGGIO



## Scheda botanica

A cura di LPP-UNIMORE

**NOME:** FRANGOLA ( *Frangula alnus* Mill. )

**FAMIGLIA:** Rhamnaceae


**CARATTERISTICHE:** portamento arbustivo, fino a 4-6 m; corteccia liscia, grigio scuro con lenticelle chiare; rametti dritti, molto sottili.

**FOGLIE:** decidue, semplici, alterne; lunghe 4-6 cm, larghe 3-4 cm; color verde intenso lucido superiormente, leggermente più chiaro ed opaco inferiormente; a margine intero e un po' ondulato; con nervature evidenti sulla pagina inferiore.

**FIORI:** a tarda primavera; in piccoli gruppi, portati su sottili e corti peduncoli a gruppi di 2-10; da verdi a bianchi fino al rosa all'estremità.

**FRUTTI:** piccole drupe globose, da 6 a 8 mm di diametro, variabili in colore dal verde al rosso fino al nero bluastro a maturità.

**AMBIENTE:** vegeta dalla pianura fino a 1300 m s.l.m. Si può considerare specie pioniera in situazioni di eccesso di umidità nel suolo.





Aree protette  
dell'Emilia-Romagna

Area di Riequilibrio Ecologico  
dell'Emilia Romagna

# Oasi di Budrio



CITTÀ DI  
CORREGGIO



## Scheda botanica

A cura di LPP-UNIMORE

**NOME:** CILIEGIO SELVATICO (*Prunus avium* (L.) L. )

**FAMIGLIA:** Rosaceae


**CARATTERISTICHE:** portamento arboreo, fino a 30 m; corteccia rosso-bruna scura con grosse lenticelle allungate e appiattite orizzontalmente; rametti sono glabri, grigi poi rossicci.

**FOGLIE:** decidue, semplici, alternate; lunghe 5-15 cm; di colore verde scuro e glabre sulla pagina superiore, più chiare e leggermente pubescenti in quella inferiore; a margine serrato.

**FIORI:** a metà primavera; ermafroditi, lungamente pedunculati, riuniti in ombrelle sui brachiblasti; di colore bianco avorio.

**FRUTTI:** drupe che maturano un paio di mesi dopo l'impollinazione, tonde di circa 1 cm, di colore rosso.

**AMBIENTE:** vegeta dalla pianura fino a 1500 m s.l.m. Non ama i ristagni d'acqua, ma preferisce suoli non troppo secchi.





Aree protette  
dell'Emilia-Romagna

Area di Riequilibrio Ecologico  
dell'Emilia Romagna

# Oasi di Budrio



CITTÀ DI  
CORREGGIO



## Scheda botanica

A cura di LPP-UNIMORE

**NOME:** FRASSINO OSSIFILLO ( *Fraxinus angustifolia* Vahl )

**FAMIGLIA:** Oleaceae


**CARATTERISTICHE:** portamento arboreo, fino a 30 m; corteccia è di colore grigio scuro, profondamente e finemente fessurata.

**FOGLIE:** decidue, composte, imparipennate, costituite da 5-13 foglioline sessili oblunگو-lanceolate, con margini seghettati.

**FIORI:** a primavera, prima che le foglie si sviluppino completamente; lunghi 5-6 mm, raggruppati in numero di 10-30. Poco appariscenti e generalmente di colore verde-giallastro.

**FRUTTI:** samare di forma lineare-lanceolata che presentano all'estremità superiore un'ala acuta provvista spesso di un rostro, mentre quella inferiore risulta cuneata.

**AMBIENTE:** vegeta dalla pianura fino a 1000 m s.l.m. Ha una preferenza per i suoli ricchi, profondi e freschi, siano essi neutri, acidi o calcarei.





Aree protette  
dell'Emilia-Romagna

Area di Riequilibrio Ecologico  
dell'Emilia Romagna

# Oasi di Budrio



CITTÀ DI  
CORREGGIO



## Scheda botanica

A cura di LPP-UNIMORE

**NOME:** PIOPPO BIANCO (*Populus alba* L. )

**FAMIGLIA:** Salicaceae


**CARATTERISTICHE:** portamento arboreo, fino a 30 m; corteccia da bianca a grigio chiara-verdastra, liscia e con lenticelle, a maturità nerastra e scabra solo nella parte bassa del fusto; rametti e gemme ricoperti da una fitta peluria.

**FOGLIE:** decidue, semplici, alterne, di due tipi (palmato-lobate e ovali o ellittiche-allungate), grossamente dentate; la pagina superiore è verde-opaca e l'inferiore è bianco-tomentosa.

**FIORI:** unisessuati, riuniti in infiorescenze che si manifestano prima delle foglie; fiori maschili prima purpurei poi gialli, femminili rosacei e più corti dei primi.

**FRUTTI:** capsule contenenti piccoli semi ricoperti da fitta peluria (i piumini) che favorisce il trasporto da parte del vento.

**AMBIENTE:** vegeta dalla pianura all'alta collina presso fiumi e laghi in stazioni umide e talvolta inondate. Pianta termofila, amante della luce.





Aree protette  
dell'Emilia-Romagna

Area di Riequilibrio Ecologico  
dell'Emilia Romagna

# Oasi di Budrio



CITTÀ DI  
CORREGGIO



## Scheda botanica

A cura di LPP-UNIMORE

**NOME:** TIGLIO SELVATICO ( *Tilia cordata* Mill. )

**FAMIGLIA:** Malvaceae


**CARATTERISTICHE:** portamento arboreo, fino a 25-30 m; corteccia liscia macchiettata, grigio-bruna, solcata longitudinalmente.

**FOGLIE:** decidue, semplici, alterne, brevemente appuntite all'apice; la pagina superiore è verde scuro e liscia, quella inferiore è verde con ciuffi di peli bruno-rugginosi all'ascella delle nervature.

**FIORI:** a inizio estate; bratteati, profumati, riuniti in infiorescenze ascellari. In piena estate rendono la chioma di un colore giallo-crema. L'impollinazione è entomofila e molto mellifera.

**FRUTTI:** nucule subglobose di circa 5-6 mm a pericarpo membranoso, fragile, tomentoso e grigiastro a maturità (ottobre) con 5 costolature appena accennate.

**AMBIENTE:** vegeta dalla pianura fino a 1500 m s.l.m. Specie piuttosto sciafila, esige buona umidità dell'aria e del suolo, tollera forti escursioni termiche.





Aree protette  
dell'Emilia-Romagna

Area di Riequilibrio Ecologico  
dell'Emilia Romagna

# Oasi di Budrio



CITTÀ DI  
CORREGGIO



## Scheda botanica

A cura di LPP-UNIMORE

**NOME:** FRASSINO MAGGIORE (*Fraxinus excelsior* L.)

**FAMIGLIA:** Oleaceae


**CARATTERISTICHE:** portamento arboreo, fino a 30 m; corteccia grigio chiaro, sviluppa un reticolo perlopiù regolare di lievi rugosità intersecate; rametti grigi.

**FOGLIE:** decidue, in coppie opposte, composte imparipennate, costituite da 9-13 foglioline con dentelli irregolari, pagina superiore opaca e inferiore con pubescenza bianca sotto la nervatura centrale.

**FIORI:** a primavera; sono riuniti in pannocchie dense, laterali che compaiono prima della fogliazione, piccoli e di colore verdastro.

**FRUTTI:** samare lunga 3-4 cm a maturazione, bruno chiaro, obovato-lineare, più o meno arrotondata alla base, maturano a settembre-ottobre.

**AMBIENTE:** vegeta dalla pianura fino a 1400 m s.l.m. Specie mesofila, esigente, richiede terreni fertili, umidi, ricchi di humus e profondi ma non compatti.





Aree protette  
dell'Emilia-Romagna

Area di Riequilibrio Ecologico  
dell'Emilia Romagna

# Oasi di Budrio



CITTÀ DI  
CORREGGIO



## Scheda botanica

A cura di LPP-UNIMORE

**NOME:** LIGUSTRO ( *Ligustrum vulgare* L. )

**FAMIGLIA:** Oleaceae


**CARATTERISTICHE:** portamento arbustivo, fino a 3 m; corteccia da grigio-verdastra a marrone chiara da giovane, grigio scura in età avanzata, provvista di rade lenticelle trasversali; rami eretti, flessibili.

**FOGLIE:** semplici, opposte, di circa 10-15 x 30-60 mm, coriacee e lucide, con margine intero; di colore verde intenso lucido superiormente, un po' più chiare ed opache nella lamina inferiore.

**FIORI:** in primavera; numerosi, odorosi, in pannocchie terminali dense, piramidali ed erette (5-8 cm); di colore bianco.

**FRUTTI:** bacche subsferiche, a maturità nero-bluastre lucide, di diametro 5-7 mm; persistenti sulla pianta per tutto l'inverno.

**AMBIENTE:** si rinviene spesso (coltivata) in siepi o (spontanea) in boscaglie e boschi radi caducifogli insieme ad altre specie arbustive.





Aree protette  
dell'Emilia-Romagna

Area di Riequilibrio Ecologico  
dell'Emilia Romagna

# Oasi di Budrio



CITTÀ DI  
CORREGGIO



## Scheda botanica

A cura di LPP-UNIMORE

**NOME:** BIANCOSPINO SELVATICO  
( *Crataegus laevigata* (Poir.) DC. )

**FAMIGLIA:** Rosaceae



**CARATTERISTICHE:** portamento arbustivo, fino a 6 m; corteccia compatta prima di colore grigio chiaro diviene in seguito bruno-rossastra; i rami giovani sono dotati di abbondanti spine acute di 6-15 mm.

**FOGLIE:** decidue, semplici, alterne, ellittiche o obovate lunghe 2-6 cm, lamina ovale incisa da 1-2 lobi poco profondi per lato con margine dentellato; glabre tranne che lungo la nervatura principale dove sono pelose.

**FIORI:** a primavera; infiorescenze in corimbi apicali, eretti, composti da 5-10 fiori ermafroditi, lunghi 5 o 6 millimetri e di colore bianco-rosato.

**FRUTTI:** piccoli pomi di circa 1 cm, ellissoidali, riuniti in grappoli; di colore rosso; maturano fra settembre e ottobre.

**AMBIENTE:** predilige le temperature miti, ma tollera bene anche il freddo invernale, indifferente al substrato, vegeta ai margini dei boschi di latifoglie, arbusteti, dalla pianura sino a 1.400 m s.l.m.



Aree protette  
dell'Emilia-Romagna

Area di Riequilibrio Ecologico  
dell'Emilia Romagna

# Oasi di Budrio



CITTÀ DI  
CORREGGIO



## Scheda botanica

A cura di LPP-UNIMORE

**NOME:** SPINO CERVINO (*Rhamnus cathartica* L.)

**FAMIGLIA:** Rhamnaceae


**CARATTERISTICHE:** portamento arbustivo, fino a 6 m; corteccia rossastra scura o grigia-scura metallica; rami per lo più contorti, i vecchi terminanti in genere con una sola spina legnosa.

**FOGLIE:** decidue, verdi lucide di sopra, più chiare e glauco-opache di sotto, subopposte sui rametti dell'anno, ovali-subrotonde od ellittiche-allungate, margine finemente dentato.

**FIORI:** a primavera; giallo-verdastri in fascetti ascellari.

**FRUTTI:** drupe tondeggianti con diametro di circa 1 cm, di colore nero a maturazione.

**AMBIENTE:** vegeta dalla pianura fino a 800 m s.l.m. Predilige terreni calcarei, anche poveri e ghiaiosi, tendenzialmente aridi ai margini dei boschi ed in cespuglieti termofili.





Aree protette  
dell'Emilia-Romagna

Area di Riequilibrio Ecologico  
dell'Emilia Romagna

# Oasi di Budrio




CITTÀ DI  
CORREGGIO



## Scheda botanica

A cura di LPP-UNIMORE

**NOME:** PRUGNOLO SELVATICO ( *Prunus spinosa* L. )



**FAMIGLIA:** Rosaceae

**CARATTERISTICHE:** portamento arbustivo, fino a 5 m; corteccia scura e rametti rossicci ludici o con pruina grigia; molti rametti laterali terminano con spine pungenti.

**FOGLIE:** compaiono dopo i fiori, decidue, alterne, lanceolate, brevemente picciolate; la pagina superiore è opaca, glabra e di color verde scuro, quella inferiore più chiara e pubescente; il margine è crenato o dentato.

**FIORI:** precedono le foglie, solitamente compaiono fra febbraio e aprile, sono ermafroditi, solitari, ma ravvicinati, di colore biancastro.

**FRUTTI:** drupe sferiche di colore blu-nerastro o viola-azzurre 10-15 mm di diametro, pruinose a maturità.

**AMBIENTE:** vegeta dalla pianura fino a 1500 m s.l.m. Specie rustica, cresce ai margini delle zone boschive, nelle siepi e negli incolti.



Aree protette  
dell'Emilia-Romagna

Area di Riequilibrio Ecologico  
dell'Emilia Romagna

# Oasi di Budrio



CITTÀ DI  
CORREGGIO



## Scheda botanica

A cura di LPP-UNIMORE

**NOME:** CORNIOLO ( *Cornus mas* L. )

**FAMIGLIA:** Cornaceae


**CARATTERISTICHE:** portamento arbustivo, fino a 6-8 m; corteccia che si desquama, grigia con crepe rossastre; rami brevi e di colore rosso-bruno.

**FOGLIE:** decidue, semplici, opposte, lunghe 6-8 cm, con un piccolo breve e peloso; forma ovata o arrotondata e sono ricoperte da peluria su entrambe le pagine; di colore verde, più chiaro nella parte inferiore.

**FIORI:** a inizio primavera; fiori gialli che sbocciano prima delle foglie e che emanano un lieve odore di miele, sono riuniti in ombrelle ascellari portate da robusti peduncoli, che si formano prima delle foglie.

**FRUTTI:** drupe ovoidali, pendule, eduli, carnose, di colore rosso scuro, contengono un nocciolo duro; giungono a maturazione da agosto a ottobre.

**AMBIENTE:** vegeta dalla pianura fino a 1500 m s.l.m. lungo le sponde dei torrenti, ai margini dei boschi di latifoglie, negli arbusteti.





Aree protette  
dell'Emilia-Romagna

Area di Riequilibrio Ecologico  
dell'Emilia Romagna

# Oasi di Budrio



CITTÀ DI  
CORREGGIO



## Scheda botanica

A cura di LPP-UNIMORE

**NOME:** FUSAGGINE (*Euonymus europaeus* L. )

**FAMIGLIA:** Celastraceae


**CARATTERISTICHE:** portamento arbustivo, fino a 5 m; fusto brunastro con rami opposti; rami giovani quadrangolari di colore verde opaco.

**FOGLIE:** decidue, semplici, opposte, ellittiche o lanceolate, margine finemente dentato; la pagina superiore verde scuro, quella inferiore più chiara.

**FIORI:** in primavera, si sviluppano contemporaneamente alle foglie; raggruppati in cime ascellari con 2-9 elementi, ermafroditi ma raramente anche unisessuali, di colore bianco.

**FRUTTI:** capsule pendule, carnose, con 4 lobi marcati, prima verdi, poi in autunno di colore rosso o rosa, lucide, 10-15 mm, i lobi aprendosi evidenziano uno pseudoarillo di colore arancione che riveste i semi, che sono tossici.

**AMBIENTE:** vegeta dalla pianura fino a 800 m s.l.m. Specie di mezz'ombra, nitrofila e che non tollera ristagni idrici.





Aree protette  
dell'Emilia-Romagna

Area di Riequilibrio Ecologico  
dell'Emilia Romagna

# Oasi di Budrio



CITTÀ DI  
CORREGGIO



## Scheda botanica

A cura di LPP-UNIMORE

**NOME:** NOCCIOLO SELVATICO ( *Corylus avellana* L. )

**FAMIGLIA:** Betulaceae


**CARATTERISTICHE:** portamento arbustivo, fino a 10 m; corteccia bruna scura, lucida, spesso desquamantesi in senso longitudinale e provvista di lenticelle.

**FOGLIE:** decidue, semplici, alterne, cuoriforme a margine dentato, provviste di peluria nella pagina inferiore; colore verde intenso nella pagina superiore, mentre è più chiaro ed opaco nella inferiore.

**FIORI:** in inverno; maschili in amenti penduli, di color giallastro, ricchi di polline a diffusione anemofila; fiori femminili provvisti di stimmi color rosso vivo.

**FRUTTI:** acheni racchiusi in un pericarpo legnoso di colore marroncino, eduli. Sono circondati quasi interamente da un involucre fogliaceo dentato.

**AMBIENTE:** vegetare in climi molto diversi e senza particolari esigenze di suolo. Può essere considerata sia specie colonizzatrice di incolti e pascoli abbandonati, sia arbusto di sottobosco, dalla pianura fino a 1700 m s.l.m.





Aree protette  
dell'Emilia-Romagna

Area di Riequilibrio Ecologico  
dell'Emilia Romagna

# Oasi di Budrio



CITTÀ DI  
CORREGGIO



## Scheda botanica

A cura di LPP-UNIMORE

**NOME:** SALICE BIANCO ( *Salix alba* L. )

**FAMIGLIA:** Salicaceae


**CARATTERISTICHE:** portamento arbustivo, fino a 25 m; corteccia color grigio-scuro o giallastra; rami eretti e ramoscelli sottili e flessibili.

**FOGLIE:** **decidue, semplici**, alterne, lanceolate-acuminate; a maturità con pagina superiore glabrescente, appena lucida e inferiore sericeo-argentea per densa pelosità; bordo finemente dentato.

**FIORI:** in inverno-inizio primavera; amenti densi, distinti in femminili e maschili. Gli amenti maschili sono lunghi fino a 7 cm, presentano due stami e antere gialle; gli amenti femminili sono pedunculati e più esili di quelli maschili.

**FRUTTI:** capsule glabre e subsessili di 4-6 mm che, a piena maturazione, si aprono in due parti liberando dei semi cotonosi.

**AMBIENTE:** specie ripariale, tollera le periodiche esondazioni, prediligendo terreni sciolti, limosi o sabbiosi, umidi, dal livello del mare a 1200 m s.l.m.





Aree protette  
dell'Emilia-Romagna

Area di Riequilibrio Ecologico  
dell'Emilia Romagna

# Oasi di Budrio



CITTÀ DI  
CORREGGIO



## Scheda botanica

A cura di LPP-UNIMORE

**NOME:** MARUSTICANO (*Prunus cerasifera* Ehrh. )

**FAMIGLIA:** Rosaceae


**CARATTERISTICHE:** portamento arboreo, fino a 8 m; corteccia bruno scuro, opaca, molto rugosa; rami spesso indurito-spinescenti all'apice nelle orme inselvaticite.

**FOGLIE:** decidue, semplici, alterne, penninervie, con lamina ovata o ellittica e margine seghettato; pagina superiore di colore verde scuro, lucida, quella inferiore più chiara con peli lungo le nervature.

**FIORI:** in primavera, prima o assieme alla comparsa delle foglie; generalmente isolati o a piccoli grappoli, di colore bianco o rosato.

**FRUTTI:** drupe rotonde di colore giallo o rosso scuro.

**AMBIENTE:** vegeta dalla pianura fino a 800 m s.l.m., specie propria della boscaglia mesofila di latifoglie.





Aree protette  
dell'Emilia-Romagna

Area di Riequilibrio Ecologico  
dell'Emilia Romagna

# Oasi di Budrio



CITTÀ DI  
CORREGGIO



## Scheda botanica

A cura di LPP-UNIMORE

**NOME:** ACERO CAMPESTRE (*Acer campestre* L. )

**FAMIGLIA:** Sapindaceae


**CARATTERISTICHE:** portamento arboreo, fino a 20 m; corteccia bruna e fessurata in placche rettangolari.

**FOGLIE:** decidue, semplici, opposte, normalmente piccole di 4-7 cm; di solito con 5 lobi ottusi, a volte solo 3 lobi, il lobo mediano e anche i laterali possono essere a loro volta leggermente lobati; di colore verde sulla pagina superiore, più chiare o anche leggermente glauscenti e pubescenti inferiormente.

**FIORI:** riuniti in corimbi terminali molto spesso poligami e compaiono contemporaneamente alle foglie in aprile-maggio. Sono pentameri, attinomorfi e con petali e sepali liberi.

**FRUTTI:** disamare alate, opposte con apertura di circa 180 gradi.

**AMBIENTE:** vegeta dalla pianura fino a circa 1000 m s.l.m., diffuso nei boschi meso-termofili.





Aree protette  
dell'Emilia-Romagna

Area di Riequilibrio Ecologico  
dell'Emilia Romagna

# Oasi di Budrio



CITTÀ DI  
CORREGGIO



## Scheda botanica

A cura di LPP-UNIMORE

**NOME:** OLMO CAMPESTRE (*Ulmus minor* Mill. )

**FAMIGLIA:** Ulmaceae


**CARATTERISTICHE:** portamento arboreo, fino a 20-30 m; corteccia liscia di colore grigio scuro.

**FOGLIE:** **decidue, semplici**, alterne, ovate, acuminate, a margine finemente dentato; superiormente lucide e di un colore verde intenso, inferiormente opache con una discreta peluria soprattutto nelle angolazioni delle nervature.

**FIORI:** in primavera; numerosi, sessili o leggermente pedunculati, riuniti in gruppo sui rametti, a formare piccole ombrelle globose.

**FRUTTI:** samare leggermente alate, di 15-20 mm, verde-giallastra, con il seme spostato verso l'apice.

**AMBIENTE:** vegeta dalla pianura fino a 1000 m s.l.m. Specie eliofila, moderatamente termofila, che predilige terreni freschi, profondi, con una buona disponibilità d'acqua e tollera bene suoli argillosi e calcarei.





Aree protette  
dell'Emilia-Romagna

Area di Riequilibrio Ecologico  
dell'Emilia Romagna

# Oasi di Budrio



CITTÀ DI  
CORREGGIO



## Scheda botanica

A cura di LPP-UNIMORE

**NOME:** ROSA SELVATICA (*Rosa canina* L.)

**FAMIGLIA:** Rosaceae


**CARATTERISTICHE:** portamento arbustivo, fino a 3 m; rami pendenti cosparsi di robuste e grosse spine, piegate o uncinata, per lo più con base ingrossata.

**FOGLIE:** decidue, composte, imparipennate, costituite da 2-3 paia di foglioline di colore verde, ovali o ovato ellittiche, appuntite, generalmente glabre o lievemente pubescenti sul rachide, dentellate ai margini.

**FIORI:** in primavera-estate; su peduncoli glabri, solitari o in gruppi di 2-3, delicatamente profumati, colore rosa pallido.

**FRUTTI:** detti cinorrodi, maturano in autunno e sono, in realtà, falsi frutti, piriformi, carnosì e glabri, solitamente portati da peduncoli lunghi 10-20 mm, di colore rosso vivo a maturità. Contengono molti acheni duri.

**AMBIENTE:** vegeta dalla pianura fino a 1900 m s.l.m. Specie pioniera molto presente in siepi o cespugli ai margini del bosco.





Aree protette  
dell'Emilia-Romagna

Area di Riequilibrio Ecologico  
dell'Emilia Romagna

# Oasi di Budrio



CITTÀ DI  
CORREGGIO



## Scheda botanica

A cura di LPP-UNIMORE

**NOME:** CARPINO BIANCO ( *Carpinus betulus* L. )

**FAMIGLIA:** Betulaceae


**CARATTERISTICHE:** portamento arboreo, fino a 15-25 m; corteccia liscia di colore grigio cenere con macchie biancastre.

**FOGLIE:** decidue, semplici, alterne, ovate, nervature ben visibili nella pagina inferiore, apice acuminato e margine dentato.

**FIORI:** in primavera; quelli maschili sono amenti allungati e penduli, di colore giallastro, quelli femminili sono dapprima eretti, poi si allungano a diventare penduli, di colore bianco panna.

**FRUTTI:** acheni che contengono i semi non alati che si propagano in maniera anemocora.

**AMBIENTE:** vegeta dalla pianura fino a 900-1000 m s.l.m. Può tollerare una certa ombra e necessita di temperature relativamente elevate. specie miglioratrice del terreno e quindi è anche preparatoria per specie più esigenti.





Aree protette  
dell'Emilia-Romagna

Area di Riequilibrio Ecologico  
dell'Emilia Romagna

# Oasi di Budrio



CITTÀ DI  
CORREGGIO



## Scheda botanica

A cura di LPP-UNIMORE

**NOME:** AMARENO ( *Prunus cerasus* L. )

**FAMIGLIA:** Rosaceae


**CARATTERISTICHE:** portamento arboreo, fino a 10 m; corteccia bruno-rossastra che si sfalda orizzontalmente.

**FOGLIE:** **decidue**, alterne, lunghe 5-8 cm e con picciolo piccolo; pagina superiore verde lucente e leggermente coriacea, margine minutamente dentato, lisce sulle due pagine.

**FIORI:** in primavera; 2-3 cm di diametro, raccolti in corimbi pedunculati di 2-4 elementi, con petali bianchi.

**FRUTTI:** drupe globose di colore rosso vivo che si inscurisce con la maturazione completa. Al centro del frutto vi è il seme di forma sferica e di colore chiaro.

**AMBIENTE:** coltivata ma talvolta inselvaticata in radure o boschi cedui radi; dal piano sino a 1.000 m s.l.m.





Aree protette  
dell'Emilia-Romagna

Area di Riequilibrio Ecologico  
dell'Emilia Romagna

# Oasi di Budrio



CITTÀ DI  
CORREGGIO



## Scheda botanica

A cura di LPP-UNIMORE

**NOME:** CANNUCCIA DI PALUDE

( *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud. )

**FAMIGLIA:** Poaceae


**CARATTERISTICHE:** pianta erbacea perenne, con grosso rizoma orizzontale ipogeo; culmi eretti alti fino 2 m.

**FOGLIE:** lanceolato-lineari, larghe fino a 2-3 cm, di colore grigiastro o verde glauco, di consistenza cartilaginea, spesso spinescenti all'apice e con margini scabri e taglienti per la presenza di piccoli aculei rivolti verso il basso.

**FIORI:** in estate; riuniti in un'ampia pannocchia di colore bruno-violaceo, generalmente unilaterale, lunga 10-40 cm, inclinata nella maturazione.

**FRUTTI:** piccole cariossidi.

**AMBIENTE:** paludi, sponde dei laghi, argini dei fiumi, stagni, fossi, in acque poco profonde, ambienti umidi anche lievemente salmastri, da 0 a 1200 (max 2000) m s.l.m.





Aree protette  
dell'Emilia-Romagna

Area di Riequilibrio Ecologico  
dell'Emilia Romagna

# Oasi di Budrio



CITTÀ DI  
CORREGGIO



## Scheda botanica

A cura di LPP-UNIMORE

**NOME:** FARNIA ( *Quercus robur* L. )

**FAMIGLIA:** Fagaceae


**CARATTERISTICHE:** portamento arboreo, mediamente fino a 30-35 m ma può raggiungere i 50 m e diametri del tronco oltre due metri; corteccia è di un colore grigio-bruno, profondamente fessurata in placche.

**FOGLIE:** decidue, alterne, subsessili, lunghe dai 7 ai 14 cm, glabre, di forma obovata con margini lobati e due vistose orecchiette alla base della foglia.

**FIORI:** in primavera; fiori maschili in amenti penduli alla base del ramo dell'anno, fiori femminili localizzati nella parte apicale del rametto.

**FRUTTI:** detti ghiande, sono acheni, spesso in coppie su un peduncolo di 5-12 cm; di colore verde chiaro, poi marrone con il procedere della maturazione.

**AMBIENTE:** vegeta dalla pianura fino a un'altitudine di 800-1000 m s.l.m. Specie che caratterizza le grandi foreste planiziali tendenzialmente continentali dell'Europa centrale e orientale, con inverni rigidi e estati calde ma mai secche.





Aree protette  
dell'Emilia-Romagna

Area di Riequilibrio Ecologico  
dell'Emilia Romagna

# Oasi di Budrio



CITTÀ DI  
CORREGGIO



## Scheda botanica

A cura di LPP-UNIMORE

**NOME:** SALICE GRIGIO ( *Salix cinerea* L. )

**FAMIGLIA:** Salicaceae


**CARATTERISTICHE:** portamento arboreo, fino a 6 m; corteccia liscia grigia-opaca o grigia-brunastra.

**FOGLIE:** decidue, semplici, alterne, provviste di picciolo e stipole, lunga da 5 a 10 cm e larga 2-4 cm, lamina da ovale-lanceolata a oblanceolata ad ellittica; sia la pagina superiore che inferiore presentano peluria.

**FIORI:** in primavera, precedenti la fogliazione; amenti maschili di colore giallo e mediamente lunghi 5 cm, con filamenti staminiferi dotati di una fine peluria che li riveste inferiormente; gli amenti femminili possono arrivare fino a 9 cm.

**FRUTTI:** capsula che tra maggio e giugno matura liberando piccoli semi.

**AMBIENTE:** vegeta dalla pianura fino a oltre 1000 m s.l.m. Predilige ambienti soleggati e umidi.





Aree protette  
dell'Emilia-Romagna

Area di Riequilibrio Ecologico  
dell'Emilia Romagna

# Oasi di Budrio



CITTÀ DI  
CORREGGIO



## Scheda botanica

A cura di LPP-UNIMORE

**NOME:** MELO SELVATICO (*Malus sylvestris* (L.) Mill. )

**FAMIGLIA:** Rosaceae


**CARATTERISTICHE:** portamento arbustivo o albero di piccole dimensioni; corteccia grigiastra che tende a screpolarsi e a formare delle scaglie.

**FOGLIE:** decidue, semplici, di forma ovato-lanceolata, a margine dentato, lunghe 3-4 cm; di colore verde pallido e ricoperte da una peluria biancastra sulla parte inferiore.

**FIORI:** in primavera; di colore bianco all'interno e rosa chiaro all'esterno, profumati e disposti in corimbi.

**FRUTTI:** chiamate mele, sono dei falsi frutti. Presentano un picciolo corto, sono di forma piuttosto arrotondata e misurano da 2 a 4 cm di diametro; di colore verde giallastro, leggermente rosato sul lato esposto al sole.

**AMBIENTE:** vegeta dalla pianura fino a una quota di 1300 m s.l.m., negli spazi marginali di boschi di latifoglie. Esige di terreni ricchi e ben drenati.





Aree protette  
dell'Emilia-Romagna

Area di Riequilibrio Ecologico  
dell'Emilia Romagna

# Oasi di Budrio



CITTÀ DI  
CORREGGIO



## Scheda botanica

A cura di LPP-UNIMORE

**NOME:** ROVERELLA ( *Quercus pubescens* Willd. )

**FAMIGLIA:** Fagaceae


**CARATTERISTICHE:** portamento arboreo, fino a 20-25 m; corteccia di colore bruno-grigiastro, profondamente solcata.

**FOGLIE:** decidue, semplici, alterne, lobato-lanceolate con lobi piuttosto profondi; lunghe 5-15 cm e larghe 3-8 cm; di colore verde brillante la lamina superiore, mentre la parte inferiore è più chiara e presenta peluria; picciolo breve e peloso.

**FIORI:** in inverno-inizio primavera; gli amenti maschili si presentano come infiorescenze a grappolo e sono gialli e penduli, quelli femminili hanno colore tendente al verde e sono o riuniti in piccolo numero o solitari.

**FRUTTI:** detti ghiande, sono acheni molto variabili in lunghezza, con cupola avvolgente la ghianda anche fino alla metà ed è formata da squame pubescenti.

**AMBIENTE:** vegeta dalla pianura fino a 800 m s.l.m. Specie molto frugale, eliofila, termofila e xerofila ma resiste molto bene anche alle basse temperature.





Aree protette  
dell'Emilia-Romagna

Area di Riequilibrio Ecologico  
dell'Emilia Romagna

# Oasi di Budrio




CITTÀ DI  
CORREGGIO



## Scheda botanica

A cura di LPP-UNIMORE

**NOME:** BIANCOSPINO COMUNE ( *Crataegus monogyna* Jacq. )



**FAMIGLIA:** Rosaceae

**CARATTERISTICHE:** portamento arbustivo, fino a 6 m; corteccia liscia di colore grigio-chiaro nelle piante giovani, brunastra nei vecchi esemplari; ramoscelli di colore bruno-rossastro, quelli laterali terminano frequentemente con spine.

**FOGLIE:** decidue, semplici, alterne, profondamente lobate, colore verde brillante e lucide nella pagina superiore, verde glaucescente nella pagina inferiore, margine dentato, suddivise in 3-7 lobi molto profondi con margine intero.

**FIORI:** in primavera; ermafroditi, bianchi, molto numerosi e riuniti in corimbi eretti semplici o composti che ne contengono circa 5-25.

**FRUTTI:** drupe diametro di circa 7-10 mm, rosse e carnose a maturità.

**AMBIENTE:** vegeta dalla pianura fino a 1.600 m s.l.m. È presente nei boschi xerofili, nelle siepi, boscaglie e cespuglieti, margine dei boschi e pendii erbosi.